



復健科常用藥品衛教

口服肌肉鬆弛劑 Baclofen

Q：為什麼我要服用這個藥？

A：治療脊髓和大腦疾病或損傷引起的肌肉痙攣。



Q：我該如何使用這個藥？

A：本藥須由醫師處方使用。通常每天一至三次飯後服藥。

Q：如果我忘記服藥怎麼辦？

A：立即服藥。但如果距離服用下一個劑量不到2小時，則不需補服藥品。

Q：當我服用這個藥的期間，還有什麼要注意的？

A：(1) 長期連續服用本藥品之患者，若經醫師指示需中止服用時宜緩慢減量，以避免發生突然的禁戒所引起的幻覺 (Hallucinations)。(2) 病人併有腎功能障礙時，應小心監控，對嚴重病患必要時應減少劑量。(3) 使用Baclofen治療期間，癲癇患者病情會加重。(4) 本藥會使人視覺模糊，昏昏欲睡，服用本藥不宜開車或操作危險的機械。(5) 懷孕期間的婦女禁止服用此藥。(6) 可能會發生血壓下降之現象，故與降血壓劑合用，應小心。

Q：這個藥的副作用有哪些？

A：低血壓、嗜睡、頭暈、頭痛、欣快感、情緒低落、幻覺、痙攣、噁心、嘔吐、肌肉無力、視覺模糊、意識混亂、口渴、血糖上升……等。

Q：我該如何保存這個藥品？

A：藥品應置於攝氏15°C~ 25°C乾燥處所；如發生變質或過期，不可再服用。