



# 復健科常用藥品衛教

## 膀胱收縮促進劑「胃可麗錠」

Q：胃可麗錠之成份及作用為何？

A：胃可麗錠之成份為25毫克之bethanechol chloride，屬擬副交感神經系統興奮劑。可增加膀胱逼尿肌的張力，促進排尿和膀胱排空的功效。



Q：胃可麗錠之適應症及療效為何？

A：胃可麗錠之適應症為手術後、產後之膀胱非阻塞性儲留，尿道之作用。口服後，尿道之作用增加，口蠕動正影響。胃可麗錠之適應症為手術後、產後之膀胱非阻塞性儲留，尿道之作用。口服後，尿道之作用增加，口蠕動正影響。

Q：胃可麗錠之禁忌為何？

A：胃可麗錠之禁忌為：1. 心臟病、心臟衰竭、心臟病後、心臟手術後、心臟病後、心臟手術後、心臟病後、心臟手術後。2. 胃潰瘍、胃酸過多、胃酸過多、胃酸過多、胃酸過多。3. 腸胃道阻塞、腸胃道阻塞、腸胃道阻塞、腸胃道阻塞。4. 腸胃道阻塞、腸胃道阻塞、腸胃道阻塞、腸胃道阻塞。5. 腸胃道阻塞、腸胃道阻塞、腸胃道阻塞、腸胃道阻塞。

Q：服用胃可麗錠時，應注意什麼？

A：服用胃可麗錠時，應注意：1. 服用時應避免飲酒。2. 服用時應避免服用其他藥物。3. 服用時應避免服用其他藥物。4. 服用時應避免服用其他藥物。5. 服用時應避免服用其他藥物。6. 服用時應避免服用其他藥物。7. 服用時應避免服用其他藥物。8. 服用時應避免服用其他藥物。9. 服用時應避免服用其他藥物。10. 服用時應避免服用其他藥物。